

IMPFKALENDER

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2013.
www.stiko.de

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



| ALTER | (in Wochen) | Säuglinge (in Monaten) | | Kleinkinder | | Kinder (in Jahren) | | | Jugendliche | Erwachsene | | | |
|---|-------------|------------------------|--------|-------------|-----------------------|--------------------|-------|-----|-------------|------------|-------|----------------------------------|-------|
| | 6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-17 | ab 18 | ab 60 |
| IMPfung | | | U4 | | U6 | U7 | U7A/8 | U7 | | | J1 | | |
| Tetanus | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | | A2 | | A (f) (alle 10 Jahre, ggf. N) | |
| Diphtherie | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | | A2 | | A (f) (alle 10 Jahre, ggf. N) | |
| Keuchhusten <small>Pertussis</small> | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | | A2 | | A (f) (ggf. N) | |
| Kinderlähmung <small>Poliomyelitis</small> | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | A1 | | ggf. N | |
| Hepatitis B | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | | | | |
| Hib <small>Haemophilus influenzae Typ b</small> | | G1 | G2 (a) | G3 | G4 | N | | | | | | | |
| Pneumokokken | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | | | | | S (c) | |
| Rotaviren | G1 (b) | G2 | (G3) | | | | | | | | | | |
| Meningokokken <small>Serogruppe C</small> | | | | | G1 (ab 12 Monaten) | | N | | | | | | |
| Masern | | | | | G1 | G2 | N | | | | | S (d) | |
| Mumps Röteln | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | |
| Windpocken <small>Varizellen</small> | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | |
| Grippe <small>Influenza</small> | | | | | | | | | | | | S (jährlich) | |
| HPV <small>Humanes Papillomvirus</small> | | | | | | | | | | | | | S (e) |

Nächste Impftermine



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c** Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- d** Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- e** Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen.
- f** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.